

Roban-Pasta

**Vor Gebrauch, Gebrauchsanweisung und beiliegende Packungsbeilage/ Merkblatt lesen.
Nur für den professionellen Einsatz. Für professionelle Anwender ist das Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.**

Der Wirkstoff Difenacoum ist ein Blutgerinnungshemmer der "2. Generation", meist genügt schon eine einmalige Köderaufnahme durch die Schädnager, eine wiederholte Annahme potenziert jedoch die Wirkung. Der Tod der Nager tritt erst zeitverzögert nach Köderaufnahme (Wirkungsverzögerung) ein. Hierdurch können keine Warnsignale an Artgenossen weitergegeben werden.

ZUGELASSENE ANWENDUNGEN UND AUFWANDSMENGE

Zielorganismus: *Rattus norvegicus* (Wanderratte) - *Mus Musculus* (Hausmaus)
Entwicklungsstufen: Jungtiere & Erwachsene Tiere
Funktion: Rodentizid, Langzeitwirkung, Blutgerinnungshemmer, Fraßgift Aufnahme
Anwendungsmethode: Verdeckte Auslegung : in Köderboxen; anders verdeckt
Anwendungsziel: Lebensmittelerschutz; Materialschutz
Formulierungstyp: Köderblock
Anwendungsbereich: In und um Gebäude/ Kanalisation
Anwenderkategorie: Berufsmäßiger und/oder Sachkundiger Verwender

AUFWANDSMENGE

1. Berufsmäßiger und/oder sachkundiger Verwender

Rattus norvegicus (Wanderratte) 200g Köder pro Köderbox oder verdeckter Köderstelle in 10 m Abstand (5 m bei starkem Befall)
Mus Musculus (Hausmaus) 40g Köder pro Köderbox oder verdeckter Köderstelle in 5 m Abstand (2 m bei starkem Befall)

Inhaber der Zulassung: PelGar International Ltd.
Unit 13 Newman Lane
Alton, Hampshire,
GU34 2QR.
Großbritannien

Vertrieb: Dein Bauernhof
Lindenstraße 12a
81545 München

T. +44 1420 807 44
www.pelgar.co.uk

T. +498923516805
F. +498992589460
E. info@dein-bauernhof.de

ANGABEN DER ZULASSUNG
Zulassungsnummer : DE-2012-MA-14-00006
Zulassungsende: 31.08.2020
Haltbarkeit: 2 Jahre

Gegenmittel: Vitamin K1 (unter ärztlicher Kontrolle).

Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit dem Mund. Waschen Sie Hände und exponierte Hautstellen vor dem Essen und nach Köderhandhabung. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett und Packungsbeilage vorzeigen).

HINWEISE FÜR DEN ARZT

Difenacoum ist ein indirektes Antikoagulans. Phytomenadion (Vitamin K1) wirkt als Gegenmittel. Bestimmen Sie die Gerinnungszeit ab 18 Stunden nach Einnahme. Sofern diese erhöht ist, Vitamin K1 verabreichen, bis sich die Gerinnungszeit normalisiert. Bestimmen Sie die Gerinnungszeit noch weitere zwei Wochen nach Absetzen des Antidots und setzen die Behandlung fort, falls in dieser Zeit wieder erhöhte Werte auftreten.

ANGABEN ZUM HANDSCHUHMATERIAL

Lagern Sie das Produkt fest verschlossen in der Originalverpackung und an einem sicheren Ort. Sollte das Produkt jedoch umgefüllt werden, so muss die neue Verpackung vollständig mit allen auf der Originalverpackung aufgeführten Informationen gekennzeichnet sein. Alle Köder und tote Nager müssen vom Befallsort entfernt und fachgerecht entsorgt werden. Die Verpackung ist vollständig zu entleeren und sicher zu entsorgen. Die Köder nicht in Bereichen auslegen, in denen die Gefahr der Kontaminierung von Lebensmitteln, Futter oder Wasser besteht (außer bei Einsatz in Abwasserleitungen). Stellen Sie sicher, dass Sie die örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften korrekt einhalten.

LAGERUNG & ENTSORGUNG

Lagern Sie das Produkt fest verschlossen in der Originalverpackung und an einem sicheren Ort. Sollte das Produkt jedoch umgefüllt werden, so muss die neue Verpackung vollständig mit allen auf der Originalverpackung aufgeführten Informationen gekennzeichnet sein. Alle Köder und tote Nager müssen vom Befallsort entfernt und fachgerecht entsorgt werden. Die Verpackung ist vollständig zu entleeren und sicher zu entsorgen. Die Köder nicht in Bereichen auslegen, in denen die Gefahr der Kontaminierung von Lebensmitteln, Futter oder Wasser besteht (außer bei Einsatz in Abwasserleitungen). Stellen Sie sicher, dass Sie die örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften korrekt einhalten.

GEFAHRENHINWEISE

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt und Behälter vorschriftsgemäß entsorgen.

GIFTNOTRUFZENTRALE

Fragen Sie bei der Giftnotrufzentrale Ihres Bundeslandes nach Hilfe, insbesondere wenn Blutungen auftreten.
Giftnotruf Berlin, Oranienburger Straße 185, 13437 Berlin
Telefon: 030/1 92 40